



Inseticida foliar para controlo das larvas de escarabeídeos (melolonta) e larvas de típulas em relvados

**Formulação / Composição**

Suspensão concentrada (SC), contendo 200 g/L ou 18,3% (p/p) de clorantraniliprol.

**Modo de Ação**

O ACELEPRYN® é um inseticida com base na substância ativa clorantraniliprol, que pertence à nova família química das diamidas antranílicas (IRAC MoA grupo 28 - modulador dos recetores de rianodina) originando um bloqueio permanente na movimentação das lagartas.

**Finalidades / Condições de utilização**

| Cultura  | Zonas  | Pragas   | Dose (L/ha) | Condições de aplicação  |
|----------|--|--|-------------|---|
| Relvados | Campos de golf<br>Campos de jogos<br>Campos desportivos e Espaços de lazer | Larvas de escarabeídeos<br>( <i>Melolontha sp.</i> ) | 0,6         | Relvados já estabelecidos.<br>Iniciar as aplicações antes ou no início do pico de voo do adulto.<br><br>Máximo de <b>1 aplicação por ano.</b> |
|          | Áreas industriais<br>Campos de aviação                                     | Larvas de típulas<br>( <i>Typula sp.</i> )           |             |   |

**Proteção Integrada**

Segundo a **Diretiva do Uso Sustentável** (Diretiva 2009/128/CE) que foi transposta para a **Lei nº 26/2013** (a 11 de Abril), é obrigatória a aplicação dos princípios gerais da Proteção Integrada por todos os utilizadores profissionais. Cumpridos esses princípios gerais, **todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos inimigos das culturas são passíveis de ser utilizados em Proteção Integrada.**

**LMR**

Não se aplica

**Modo de Preparação da Calda e Utilização**

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

**Para aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:**

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Recomenda-se a utilização de bicos Syngenta XC com tecnologia anti-drift, que garantem pelo menos 79% de redução no arrastamento de calda durante a aplicação do produto.

**Volume de calda recomendado:** 500 L/ha.

#### Precauções Biológicas

- O ACELEPRYN®, não deve ser aplicado nos locais onde comecem a verificar-se quebras de eficácia após as aplicações do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de ação existentes no mercado.
- O produto só controla eficazmente as larvas até ao 2º instar
- Quando usado de acordo com as recomendações do rótulo, o ACELEPRYN®, é bem tolerado por todas as espécies de relvados mais comuns.
- Não aplicar em relvados que se encontrem sob stress hídrico ou térmico.

#### Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

##### ATENÇÃO

- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, em campos desportivos e de lazer, não aplicar o produto em solos com drenagem artificial.
- Para proteção dos organismos aquáticos, em campos desportivos e de lazer, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície, incluindo 20 metros de coberto vegetal.
- Para proteção dos organismos aquáticos, em campos de golfe, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
- Para proteção das águas subterrâneas e dos organismos aquáticos, não aplicar este produto de Novembro a Maio.
- Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
- O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção durante a aplicação do produto.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas durante 6 horas após a aplicação.
- Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.

**Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250.**



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



#### Embalagens

600 ml.

Autorização de venda n.º 1764 concedida pela DGAV

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM.**

FT: xxxx21